

Đubrivo na bazi bakra



SASTAV

Bakar (Cu) 17,0%

Sumpor (S) 20,0%

KARAKTERISTIKE

Borac Kombo je tečno đubrivo sa visokim sadržajem bakra trobaznog i elementarnog sumpora koje je namenjeno ishrani i zaštiti biljaka. Bakar je metal koji ima fundamentalnu ulogu u poljoprivredi budući da se radi o mikroelementu neophodnom za obavljanje važnih metaboličkih reakcija, sintezu hlorofila i auksina, biljnih hormona odgovornih za razvoj.



Sumpor je mezo-element koji biljke apsorbuju u ograničenim količinama, često ga nema u luženom zemljištu, a namenjen je sintezi sumpornih aminokiselina, kao što su cistein i metionin. Sumpor je takođe neophodan za proizvodnju biotina, esencijalnog vitaminskog ko-faktora za sintezu masnih kiselina, kao i glutaciona, tripeptida sa antioksidantnim svojstvima. Kada se nanese na površinu listova, bakar i sumpor doprinose i održavanju zdravlja biljke, budući da smanjuju štetu uzrokovanu gljivičnim oboljenjima (siva plesan, čađava pegavost, plamenjača, pepelnica) i parazitima (grinje i brašnaste bube).

Borac Kombo ostavlja plavu boju na tretiranoj vegetaciji što pomaže u proceni raspodele i ujednačenosti tretiranih površina.

UPOZORENJA



Borac Kombo se ne sme mešati sa mineralnim uljima i baznim supstancama kod biljaka u vegetativnom periodu. Obratite pažnju na one vrste vinovih loza i povrća iz porodice Cucurbitaceae osetljivih na sumpor.



PRIMENE



**Prskanje sadnica
pre presađivanja**



**Uranjanje semena,
korenastog povrća**

NAČIN PRIMENE

KULTURA	FAZA PRIMENE	DOZA ZA FOLIJARNU PRIMENU
Maslina	Intervencije u fazi pre cvetanja, promene boje i nakon berbe	3-4 L/1000 L
Jabuka, kruška, orah, lešnik	Intervencije u zimskom periodu, prilikom izbijanja pupoljaka (zeleni krajevi), pre cvetanja, razvića ploda i tokom rasta ploda	2-3 L/1000 L
Vinova loza, citrusi	Intervencije u fazi pucanja pupoljaka, rasta klica, formiranja cvasti, nakon razvića ploda i pre zatvaranja grozda na svakih 15 dana	2,5-3,5 L/1000 L
Krompir, paradajz	Intervencije na svakih 15-20 dana od trenutka presađivanja ili sejanja	2-3 L/1000 L
Jagoda, malina, borovnica, ribizla	Intervencije na svakih 15-20 dana u fazi pre cvetanja i nakon cvetanja	2,5-3,5 L/1000 L
Povrće (špargla, artičoke, kupus, karfiol, krastavac, lubenica, dinja, tikvice, salata, grašak, pasulj, boranija, plavi patlidžan, celer, komorač, radić, cikorija)	Intervencije na svakih 15-20 dana tokom perioda vegetativnog razvoja	2-3 L/1000 L
Tretman drvenastih biljaka u zimskom periodu do faze pucanja pupoljaka	Intervencije nakon opadanja lišća i ponovnog bubrenja pupoljaka	4-6 L/1000 L
Ukrasne biljke	Intervencije na svakih 15-20 dana tokom perioda vegetativnog razvoja	2-3 L/1000 L



1 L / 250 ml



12 kom / 40 kom



600 kg / 500 kg

1 L

250 ml



8 606019 420123



8 606019 420116