

Rastvor kalcijum nitrata i magnezijuma

SASTAV


Ukupno azota 8,0%

Nitratni oblik azota 8,0%


Kalcijum-oksidi (CaO) rastvorljiv u vodi 10,0%

Magnezijum-oksidi (MgO) rastvorljiv u vodi 4,0%

KARAKTERISTIKE



MAGIJA je tečno đubrivo na bazi kalcijuma i magnezijuma koje služi da nadomesti manjak ovih hranljivih elemenata u zemljištu i u najzahtevnijim kulturama. Potreba za kalcijumom i magnezijumom se povećava u stadijumima podmaklog vegetativnog razvoja pre cvetanja i kasnije tokom formiranja i rasta plodova, kada ovi elementi postaju od suštinskog značaja za formiranje ćelijskog tkiva i održavanje ćelijske jedrosti. Kulture koje su posebno osetljive na manjak kalcijuma i magnezijuma ili na promenu ravnoteže odnosa kalcijuma, magnezijuma i kalijuma mogu iskazati posebne fiziopatije, kao što su propadanje vrhova listova (tip burn) zelene salate, vršna trulež paradajza i paprike, vršno sušenje šepurine vinskog i stonog grožđa, gorke pege (bitter pit) jabuke, pucanje pokožice breskve, nektarine i trešnje, trulež srca dinje i lubenice. MAGIJA ne sadrži hlor i brzo se apsorbuje u plod i u listove.



*Povećava dimenzije i masu plodova
Stimuliše cvetanje i otvaranje pupoljaka*



PRIMENE



Prskanje sadnica
pre presađivanja



Navodnjavanje kap po kap

NAČIN PRIMENE

KULTURA	FAZA PRIMENE	DOZA	
		PREKO LISTOVA	PREKO ZEMLJIŠTA
Voćke (jabuka, kruška, breskva, kajsija, trešnja i višnja, šljiva)	Nanositi pre cvetanja, tokom razvića i rasta plodova 3-4 puta na svakih 10-15 dana	150-200 g/1000 L	20 kg/ha
Povrće	Nanositi 4-5 puta na svakih 10-15 dana tokom perioda vegetativnog razvoja	150-300 g/1000 L	10-15 kg/ha
Paradajz, plavi patlidžan, dinja	Intervencije nakon presađivanja, nakon razvića ploda, rasta bobica na svakih 10-15 dana	150-200 g/1000 L	10-15 kg/ha
Endivija, zelena salata	Intervencije u periodu nakon presađivanja i na svakih 10 dana		8-12 kg/ha
Celer, komorač	Intervenirati od 4-5. lista na svakih 15-20 dana		10-15 kg/ha
Grožđe za vino i za jelo	Intervenirati u fazi nakon razvića plodova, rasta ploda grožđa i promene boje		15 kg/ha
Ukrasne biljke i cveće	Naneti 1-2 puta pre i tokom cvetanja		8-10 kg/ha
Ostale kulture		100 g/1000 L	10-15 kg/ha

UPOZORENJA

U zaštićenom okruženju (plastenici, tuneli, itd.) doza ne sme da pređe 150 g/hl (0,15%). Izbegavajte primenu u najtoplijim delovima dana.



5 kg / 1 kg



4 kom/20 kom



600 kg/600 kg

5 kg



8 606019 420093

1 kg



8 606019 420086