

Borac Plus

Br. upisa: 321-01-00487/2017-11 od 28.11.2017

Đubrivo na bazi bakra



SASTAV

Bakar (Cu) 20%
Sumpor (S) 30%



KARAKTERISTIKE


Borac Plus je đubrivo u prahu sa visokim sadržajem bakra trobaznog i elementarnog sumpora koje je namenjeno ishrani i zaštiti biljaka. Bakar je metal koji ima fundamentalnu ulogu u poljoprivredi budući da se radi o mikroelementu neophodnom za obavljanje važnih metaboličkih reakcija, sintezi hlorofila i auksina, biljnih hormona odgovornih za razvoj. Sumpor je mezo-element koji biljke apsorbuju u ograničenim količinama, često ga nema u luženom zemljištu, a namenjen je sintezi sumpornih aminokiselina, kao što su cistein i metionin. Sumpor je takođe neophodan za proizvodnju biotina, esencijalnog vitaminskog ko-faktora za sintezu masnih kiselina, kao i glutationa, tripeptida sa antioksidantnim svojstvima. Kada se nanesu na površinu listova, bakar i sumpor doprinose i održavanju zdravlja biljke, budući da povećavaju njenu otpornost na patogene i parazite. Borac Plus ne ostavlja mrlje na vegetaciji i može se koristiti kod onih kultura kod kojih je važan estetski izgled u trenutku berbe.



PRIMENE



**Prskanje sadnica
pre presađivanja**



**Uranjanje semena,
korenastog povrća**

NAČIN PRIMENE

| KULTURA | FAZA PRIMENE | DOZA ZA FOLIJARNU PRIMENU |
|---|--|--|
| Maslina | Intervenisati u fazi vegetativnog oporavka i pre berbe | 2,5 kg/1000 L |
| Jabuka, kruška, jagoda, borovnica, malina, ribizla | Intervenisati u fazi ponovo nabubrelog pupoljka, pre cvetanja, razvića i rasta ploda na svakih 10-15 dana | 2 kg/1000 L |
| Vinova loza, citrusi | Intervenisati u fazi pucanja pupoljaka, rasta klica, formiranja cvasti, nakon razvića ploda i pre zatvaranja grozda na svakih 10-15 dana | 2-2,5 kg/1000 L |
| Žitarice | Intervenisati u fazi bokorenja i početka rasta stabljike. | 2 kg/1000 L |
| Zasadi povrća u plasteniku i na otvorenom polju, industrijsko i ukrasno bilje | Intervenisati tokom perioda vegetativnog razvoja i rasta ploda na svakih 15 dana | 2-2,5 kg/1000 L |
| Uranjanje semena, korenastog povrća i lukovica | Rastvoriti preporučenu dozu u 10 L vode i naneti ravnomerno na površinu semena, korenastog povrća i lukovica pre sadnje | 100 g/100 kg semena, korenastog povrća, lukovice |

UPOZORENJA

Borac Plus se ne sme mešati sa mineralnim uljima i baznim supstancama kod biljaka u vegetativnom periodu. Obratite pažnju na one vrste vinovih loza i povrća iz porodice Cucurbitacee osetljivih na smpor.

